

**Circolare 25613 dell'11 agosto 2023**

<p><b>PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.</li> <li>• Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.</li> <li>• Applicare una corretta igiene delle mani.</li> <li>• Evitare ambienti affollati.</li> <li>• Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.</li> <li>• Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente recedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.</li> <li>• Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.</li> </ul>
<p><b>PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19</b></p>	<p>Nessuna misura restrittiva.</p> <p>Attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.</p> <p>Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza.</p> <p>Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.</p>